

GOLD LINE

Instrukcje stosowania

Dezynfekcja jaj wylęgowych w temperaturze pokojowej w inkubatorze

Grupa(-y) produktowa(-e)	3
W stosownych przypadkach dokładny opis stosowania	
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	<i>bakterie</i> <i>drożdże</i> <i>grzyby</i>
Obszar(y) zastosowania	Wewnątrz budynków, wylęgarnie (inkubator), dezynfekcja jaj wylęgowych
Sposób(-oby) nanoszenia	Układ zamknięty: zamglawianie na zimno
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	1 l nierozcieńzonego produktu 15 m ³ (= 0,067 l/m ³); mediana wielkości kropli ≤15 µm
Kategoria(-e) użytkowników	specjaliści
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka 1 l (PE) Puszka 20 l (HDPE) Beczka 220 l (HDPE) Kontener IBC 1000 l (PE)

Instrukcje stosowania

Załadunek produktu:

Produkt może być przenoszony/ładowany tylko za pomocą automatycznych pomp.

1 l produktu na 15 m³ (= 0,067 l/m³) musi być rozprowadzany przez co najmniej 30 minut. Po osiągnięciu stosowanej dawki 0,067 l/m³ rozpoczyna się czas kontaktu.

W celu uzyskania skuteczności bakteriobójczej, drożdżobójczej i grzybobójczej należy zapewnić działanie w temperaturze 20°C przez 60 minut czasu kontaktu. Następnie powietrze w komorze wymienia się za pomocą układu wentylacyjnego.

Produkt stosowany jako roztwór gotowy do użycia.

Dezynfekcja po każdym ponownym napełnieniu komory dezynfekcyjnej jajami.
Do użytku tylko w suchych pomieszczeniach o kubaturze 4–150 m³.

Ocena biologiczna powinna być przeprowadzona przez użytkownika produktów biobójczych w przypadku każdej konfiguracji pomieszczenia (w tym np. jaj wylęgowych, urządzeń), które mają być dezynfekowane przez zamglawianie (lub w odpowiednim „standardowym” pomieszczeniu w obiekcie, jeśli dotyczy) z urządzeniami, które mają zostać użyte, po czym można sporządzić protokół dotyczący procesów dezynfekcji w tych pomieszczeniach i wykorzystać go w późniejszym terminie.

Dezynfekcja jaj wylęgowych w temperaturze 36°C np. w klujniku

Grupa(-y) produktowa(-e)	3
W stosownych przypadkach dokładny opis stosowania	
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	<i>bakterie</i> <i>drożdże</i> <i>grzyby</i>
Obszar(y) zastosowania	Wewnątrz budynków, wylęgarnie (klujnik), dezynfekcja jaj wylęgowych
Sposób(-oby) nanoszenia	Układ zamknięty: zamglawianie na zimno
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	1 l nierozcieńzonego produktu na 15 m ³ (= 0,067 l/m ³); mediana wielkości kropli ≤15 µm
Kategoria(-e) użytkowników	specjaliści
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka 1 l (PE) Puszka 20 l (HDPE) Beczka 220 l (HDPE) Kontener IBC 1000 l (PE)

Instrukcje stosowania

Załadunek produktu:

Produkt może być przenoszony/ładowany tylko za pomocą automatycznych pomp.

1 l produktu na 15 m³ (= 0,067 l/m³) musi być rozprowadzany przez co najmniej 30 minut. Po osiągnięciu stosowanej dawki 0,067 l/m³ rozpoczyna się czas kontaktu.

W celu uzyskania skuteczności bakteriobójczej, drożdżobójczej i grzybobójczej należy zapewnić działanie w temperaturze 36°C przez 60 minut czasu kontaktu. Następnie powietrze w komorze wymienia się za pomocą układu wentylacyjnego.

Produkt stosowany jako roztwór gotowy do użycia.

Dezynfekcja po każdym ponownym napełnieniu komory dezynfekcyjnej jajami.

Do użytku tylko w suchych pomieszczeniach o kubaturze 4–150 m³.

Ocena biologiczna powinna być przeprowadzona przez użytkownika produktów biobójczych w przypadku każdej konfiguracji pomieszczenia (w tym np. jaj wylęgowych, urządzeń), które mają być dezynfekowane przez zamglawianie (lub w odpowiednim „standardowym” pomieszczeniu w obiekcie, jeśli dotyczy) z urządzeniami, które mają zostać użyte, po czym można sporządzić protokół dotyczący procesów dezynfekcji w tych pomieszczeniach i wykorzystać go w późniejszym terminie.

Środki zmniejszające ryzyko

Załadunek produktu:

- 1) Podczas obsługi produktu zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.

Stosowanie produktu:

- 2) Stosowanie produktu jest dozwolone tylko w zamkniętych, hermetycznych układach do dezynfekcji. Podczas procesu dezynfekcji pracownicy nie mogą być obecni./ Podczas aplikacji pracownicy nie mogą przebywać w komorze dezynfekcyjnej.
- 3) Dezynfekcję należy rozpocząć tylko z zewnątrz, aby uniknąć kontaktu ze środkiem dezynfekcyjnym.
- 4) Podczas dezynfekcji komora musi pozostać hermetycznie zamknięta i należy zapobiegać ponownemu wejściu. Należy wskazać, że trwa proces dezynfekcji.
- 5) Po aplikacji komorę należy całkowicie przewietrzyć układem wentylacji technicznej.
- 6) Ponowne wejście jest dozwolone tylko wtedy, gdy produkt wyschnie na wszystkich powierzchniach, a stężenie kwasu nadoctowego i nadtlenu wodoru w powietrzu spadnie poniżej odpowiednich wartości referencyjnych (AEC). W celu zapewnienia wystarczającej wentylacji należy albo zastosować układ do dezynfekcji wyposażony w czujniki wskazujące, kiedy odpowiednie stężenia spadną poniżej wartości referencyjnych, albo wymagany czas trwania wentylacji technicznej należy ustalić, wykonując pomiar za pomocą odpowiedniego urządzenia pomiarowego dla każdej instalacji technicznej oraz po każdej zmianie odpowiednich warunków brzegowych.

Naprawa lub konserwacja pomp dozujących:

- 7) Przed ingerencją w pompy należy w większości usunąć istniejące pozostałości produktu, przepłukując pompy.

Szczegóły dotyczące prawdopodobnych bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc

- 1) W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku wystąpienia objawów natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
- 2) W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. Jeśli osoba narażona jest w stanie połykać, podać napój. NIE wywoływać wymiotów. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
- 3) W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przeemyć skórę pod strumieniem wody. W przypadku wystąpienia objawów natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
- 4) W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Spłukać pod strumieniem wody. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Przemywać przez około 5 minut. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Środowisko:

- 5) Unikać bezpośredniego uwolnienia nierozcieńczonego produktu do środowiska i kanalizacji.
- 6) Duże wycieki: Przykryć ciecz materiałem chłonnym. Zabezpieczyć i zebrać w celu utylizacji.

Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- 1) Pozostałości produktu biobójczego należy usuwać zgodnie z Dyrektywą w sprawie odpadów (2008/98/WE) i Europejskim katalogiem odpadów (EWC) oraz przepisami krajowymi i regionalnymi.
- 2) Nie wprowadzać do kanalizacji.
- 3) Zawartość/pojemnik zutylizować w autoryzowanym punkcie zbiórki odpadów.
- 4) Produkty biobójcze pozostawić w oryginalnych opakowaniach. Nie mieszać z innymi odpadami.
- 5) Po całkowitym opróżnieniu pojemniki nadają się do recyklingu.

Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

- 1) Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy.
- 2) Chronić przed mrozem.
- 3) Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Inne informacje

- 1) Należy pamiętać o wartości referencyjnej UE wynoszącej 0,5 mg/m³ dla substancji czynnej kwasu nadoctowego (nr CAS: 79-21-0), która została wykorzystana do oceny ryzyka dla tego produktu.
- 2) Należy pamiętać o wartości referencyjnej UE wynoszącej 1,25 mg/m³ dla przedmiotowej substancji, nadtlenku wodoru (nr CAS: 7722-84-1), która została wykorzystana do oceny ryzyka dla tego produktu.
- 3) Należy pamiętać o wartości referencyjnej UE wynoszącej 17,9 mg/kg mc/d dla przedmiotowej substancji, propan-2-olu (nr CAS: 67-63-0), która została wykorzystana do oceny ryzyka dla tego produktu.
- 4) Wartość orientacyjna: wilgotność względna testowana zgodnie z przyjętą normą EN 17272 pod kątem skuteczności: 33–53%.